

¿TIENE PREGUNTAS? PREGUNTE A SU MÉDICO ACERCA DE FRUZAQLA



Es importante que hable con su médico sobre qué esperar con el tratamiento. Utilice esta guía para ayudarlo a iniciar la conversación*

*Esta herramienta no está diseñada para proporcionar asesoramiento médico.

 **Fruzaqla**[®]
(fruquintinib) capsules
5 mg • 1 mg

¿Qué es FRUZAQLA[®] (fruquintinib)?

FRUZAQLA es un medicamento recetado utilizado para tratar a adultos con cáncer de colon o recto que se ha extendido a otras partes del cuerpo (cáncer colorrectal metastásico [CCRM]) y que han recibido tratamiento previo con ciertos medicamentos contra el cáncer.

No se sabe si FRUZAQLA es seguro y eficaz en niños.

Consulte la Información importante de seguridad adicional en todo el documento, la Información importante de seguridad completa en las páginas 6-9 y la Información para el paciente en la Información [de prescripción completa](#) de FRUZAQLA que se acompaña.

PREGUNTAS DE DEBATE



¿Por qué estoy tomando FRUZAQLA?



¿En qué se diferencia FRUZAQLA de la quimioterapia?



¿Cómo debo tomar FRUZAQLA?



¿Con qué frecuencia tendré que visitar a mi médico mientras tomo FRUZAQLA?

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

FRUZAQLA puede causar efectos secundarios graves, incluidos los siguientes:

- **Presión arterial alta (hipertensión).** La presión arterial alta es frecuente con FRUZAQLA y también puede ser grave. Su proveedor de atención médica comprobará su presión arterial antes de iniciar el tratamiento con FRUZAQLA, una vez a la semana durante el primer mes de tratamiento y, a continuación, al menos una vez al mes o con una frecuencia mayor si es necesario durante el tratamiento. Su proveedor de atención médica puede recetarle medicamentos para tratar su presión arterial alta si es necesario. Informe a su proveedor de atención médica si experimenta alguno de los siguientes síntomas de hipertensión durante el tratamiento: dolor de cabeza intenso, aturdimiento o mareo, confusión, cambios en la visión, dolor en el pecho, dificultad para respirar, hemorragias nasales o vómitos.

Consulte la Información importante de seguridad adicional en todo el documento, la Información importante de seguridad completa en las páginas 6-9 y la Información para el paciente en la Información [de prescripción completa](#) de FRUZAQLA que se acompaña.



¿Cuáles son algunos de los posibles efectos secundarios de FRUZAQLA y qué debo hacer si experimento alguno?



¿Qué pasa si me salteo una dosis?



¿Cómo afectará FRUZAQLA a mi vida diaria?

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)

- **Sangrado grave (hemorragia).** FRUZAQLA puede provocar sangrado que puede ser grave y causar la muerte. Informe a su proveedor de atención médica si presenta alguno de los siguientes síntomas de sangrado durante el tratamiento:
 - hemorragia inusual, grave o que no se detiene
 - moretones
 - aturdimiento
 - vómitos con sangre o vómitos con aspecto de granos de café
 - sangre en las heces o heces negras con aspecto de alquitrán
 - sangre en la orina u orina que parece roja, rosa o marrón
 - tos con sangre o coágulos de sangre
 - sangrado menstrual más abundante de lo normal
 - sangrado vaginal inusual
 - sangrado nasal frecuente

Consulte la Información importante de seguridad adicional en todo el documento, la Información importante de seguridad completa en las páginas 6-9 y la Información para el paciente en la Información [de prescripción completa](#) de FRUZAQLA que se acompaña.



Fruzaqla[®]
(fruquintinib) capsules
5 mg • 1 mg



Su médico puede cambiarle la dosis de FRUZAQLA si es necesario

Tome FRUZAQLA exactamente como le indique su médico.
Asegúrese de hablar con su médico o farmacéutico si tiene alguna pregunta sobre FRUZAQLA o su dosis.

Consulte la Información importante de seguridad adicional en todo el documento, la Información importante de seguridad completa en las páginas 6-9 y la Información para el paciente en la Información de prescripción completa de FRUZAQLA que se acompaña.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

¿Qué es FRUZAQLA® (fruquintinib)?

FRUZAQLA es un medicamento recetado utilizado para tratar a adultos con cáncer de colon o recto que se ha extendido a otras partes del cuerpo (cáncer colorrectal metastásico [CCRm]) y que han recibido tratamiento previo con ciertos medicamentos contra el cáncer.

No se sabe si FRUZAQLA es seguro y eficaz en niños.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

FRUZAQLA puede causar efectos secundarios graves, incluidos los siguientes:

- **Presión arterial alta (hipertensión).** La presión arterial alta es frecuente con FRUZAQLA y también puede ser grave. Su proveedor de atención médica comprobará su presión arterial antes de iniciar el tratamiento con FRUZAQLA, una vez a la semana durante el primer mes de tratamiento y, a continuación, al menos una vez al mes o con una frecuencia mayor si es necesario durante el tratamiento. Su proveedor de atención médica puede recetarle medicamentos para tratar su presión arterial alta si es necesario. Informe a su proveedor de atención médica si experimenta alguno de los siguientes síntomas de hipertensión durante el tratamiento: dolor de cabeza intenso, aturdimiento o mareo, confusión, cambios en la visión, dolor en el pecho, dificultad para respirar, hemorragias nasales o vómitos.
- **Sangrado grave (hemorragia).** FRUZAQLA puede provocar sangrado que puede ser grave y causar la muerte. Informe a su proveedor de atención médica si presenta alguno de los siguientes síntomas de sangrado durante el tratamiento:
 - hemorragia inusual, grave o que no se detiene
 - moretones
 - aturdimiento
 - vómitos con sangre o vómitos con aspecto de granos de café
 - sangre en las heces o heces negras con aspecto de alquitrán
 - sangre en la orina u orina que parece roja, rosa o marrón
 - tos con sangre o coágulos de sangre
 - sangrado menstrual más abundante de lo normal
 - sangrado vaginal inusual
 - sangrado nasal frecuente
- **Infecciones.** FRUZAQLA puede aumentar el riesgo de infecciones, incluidas infecciones graves que pueden provocar la muerte. Las infecciones más frecuentes con FRUZAQLA se produjeron en las vías urinarias, la nariz o la garganta y los pulmones. Informe a su proveedor de atención médica si experimenta alguno de los siguientes síntomas de infección durante el tratamiento: fiebre, tos intensa con o sin aumento de la producción de mucosidad (esputo), dolor de garganta intenso, dificultad para respirar, sensación de ardor o dolor al orinar, o enrojecimiento, hinchazón o dolor en cualquier parte del cuerpo.

Consulte la Información importante de seguridad que continúa en la página siguiente y la Información para el paciente en la Información [de prescripción completa](#) que se acompaña.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)

- **Un desgarro en el estómago o en la pared intestinal (perforación gastrointestinal).** FRUZAQLA puede causar perforación gastrointestinal que puede ser grave y provocar la muerte. Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si experimenta alguno de los siguientes síntomas de perforación gastrointestinal durante el tratamiento: dolor de estómago (abdominal) intenso o dolor de estómago que no desaparece, vómitos o vómitos con sangre, sangre en las heces o heces negras que se parece al alquitrán, fiebre o escalofríos, o náuseas.
- **Problemas hepáticos.** El aumento de las enzimas hepáticas en sangre es frecuente con FRUZAQLA y también puede ser grave y provocar la muerte. Su proveedor de atención médica le hará análisis de sangre antes y durante el tratamiento con FRUZAQLA para controlar si hay problemas hepáticos. Informe a su proveedor de atención médica si experimenta alguno de los siguientes síntomas de problemas hepáticos durante el tratamiento: color amarillento en la piel o en la parte blanca de los ojos, orina de color oscuro (color del té), dolor en la zona superior derecha del estómago (abdomen), pérdida del apetito, náuseas o vómitos, o sangrado o moretones.
- **Proteínas en la orina (proteinuria).** Las proteínas en la orina son frecuentes con FRUZAQLA y también puede ser grave. Su proveedor de atención médica controlará su orina para detectar proteínas antes de iniciar y durante el tratamiento con FRUZAQLA. Informe a su proveedor de atención médica si tiene que orinar más de lo habitual o si tiene hinchazón de cara, manos, brazos, piernas o pies durante el tratamiento.
- **Reacciones cutáneas en las manos o en los pies (eritrodisestesia palmo-plantar [EPP]).** Las reacciones cutáneas en las manos o en los pies son frecuentes con FRUZAQLA y también pueden ser graves. Informe a su proveedor de atención médica si tiene una erupción cutánea grave o enrojecimiento, dolor, ampollas, sangrado o hinchazón en las palmas de las manos o las plantas de los pies durante el tratamiento.
- **Síndrome de encefalopatía posterior reversible (SEPR).** La SERP es una afección grave que puede producirse en su cerebro durante el tratamiento con FRUZAQLA. Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si presenta alguno de los siguientes síntomas durante el tratamiento: dolor de cabeza, convulsiones, confusión, cambios en la visión o problemas para pensar.
- **Problemas de cicatrización de heridas.** Las heridas pueden no curarse adecuadamente durante el tratamiento con FRUZAQLA. Informe a su proveedor de atención médica si prevé someterse a alguna cirugía antes o durante el tratamiento con FRUZAQLA. Debe dejar de tomar FRUZAQLA al menos 2 semanas antes de la cirugía programada. Su proveedor de atención médica le comunicará cuándo puede empezar a tomar FRUZAQLA de nuevo después de la cirugía.

Consulte la Información importante de seguridad que continúa en la página siguiente y la Información para el paciente en la Información [de prescripción completa](#) que se acompaña.

 **Fruzaqla**[®]
(fruquintinib) capsules
5 mg • 1 mg

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)

- **Coágulos de sangre en los vasos sanguíneos (arterias).** FRUZAQLA puede provocar coágulos de sangre o el bloqueo de los vasos sanguíneos lo que puede provocar ataque cardíaco, accidente cerebrovascular o la muerte. Busque atención médica de inmediato si presenta alguno de los siguientes síntomas durante el tratamiento:
 - dolor o presión intensos en el pecho
 - dolor en los brazos, las piernas, la espalda, el cuello o la mandíbula
 - dificultad para respirar
 - entumecimiento o debilidad de la cara, brazo o pierna, especialmente en un lado del cuerpo
 - sensación de aturdimiento o desmayo
 - sudoración en más cantidad de lo habitual
 - confusión repentina, dificultad para hablar o comprender cosas
 - problemas para caminar
 - dolor de cabeza repentino e intenso
 - cambios repentinos en la visión de uno o ambos ojos
 - mareos o pérdida del equilibrio o la coordinación
- **Reacciones alérgicas a FD&C amarilla n.º 5 y FD&C amarilla n.º 6.** Las cápsulas de FRUZAQLA 1 mg contienen los ingredientes inactivos FD&C amarilla n.º 5 (tartrazina) y FD&C amarilla n.º 6 (amarillo ocaso FCF). La FD&C amarilla n.º 5 (tartrazina) puede provocar reacciones de tipo alérgico (incluido el asma bronquial) en ciertas personas, especialmente en personas que también tienen alergia a la aspirina. La FD&C amarilla n.º 6 (amarillo ocaso FCF) también puede provocar reacciones alérgicas. Informe a su proveedor de atención médica si experimenta urticaria, erupción cutánea o dificultad para respirar durante el tratamiento con FRUZAQLA.

Los efectos secundarios más comunes de FRUZAQLA incluyen:

- cambios en la voz o ronquera
- dolor en el área del estómago (abdominal)
- diarrea
- debilidad, falta de fuerzas y energía, y sensación de mucho cansancio o somnolencia (astenia)

FRUZAQLA puede causar problemas de fertilidad en mujeres, lo que puede afectar su capacidad de concebir hijos. Hable con su proveedor de atención médica si tiene dudas sobre la fertilidad.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de FRUZAQLA. Llame a su médico para obtener asesoramiento médico sobre los efectos secundarios. **Puede informar los efectos secundarios a Takeda al 1-844-662-8532 o con la FDA a 1-800-FDA-1088 o www.fda.gov/medwatch.**

Antes de tomar FRUZAQLA, informe a su proveedor de atención médica acerca de todas sus afecciones médicas, incluido si:

- Tiene presión arterial alta
- Tiene problemas de sangrado

Consulte la Información importante de seguridad que continúa en la página siguiente y la Información para el paciente en la Información [de prescripción completa](#) que se acompaña.

 **Fruzaqla**[®]
(fruquintinib) capsules
5 mg • 1 mg

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)

- Tiene una infección
- Tiene problemas hepáticos o renales
- Planea someterse a algún procedimiento quirúrgico o se ha sometido a una cirugía recientemente. Debe dejar de tomar FRUZAQLA al menos 2 semanas antes de su cirugía programada. Su proveedor de atención médica le dirá cuándo puede comenzar de nuevo con FRUZAQLA después de la cirugía
- Haber tenido recientemente un coágulo de sangre, un accidente cerebrovascular o un ataque cardíaco
- Es alérgico a FD&C amarilla n.º 5 (tartrazina) o a FD&C amarilla n.º 6 (amarillo ocaso FCF)
- Está embarazada o planea quedar embarazada. FRUZAQLA puede dañar al bebé en gestación. No debe quedar embarazada durante el tratamiento con FRUZAQLA.

Mujeres que pueden quedar embarazadas:

- Su proveedor de atención médica le hará una prueba para la detección del embarazo antes de que comience el tratamiento con FRUZAQLA.
- Use un método anticonceptivo eficaz (contracepción) durante el tratamiento y durante 2 semanas después de la última dosis de FRUZAQLA.
- Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si queda embarazada durante el tratamiento con FRUZAQLA.

Hombres con parejas de sexo femenino que pueden quedar embarazadas:

- Use un método anticonceptivo eficaz durante el tratamiento y durante 2 semanas después de la última dosis de FRUZAQLA.
- Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si su pareja queda embarazada durante su tratamiento con FRUZAQLA.
- Está amamantando o planea hacerlo. Se desconoce si FRUZAQLA pasa a la leche materna. No amamante durante el tratamiento y durante 2 semanas después de la última dosis de FRUZAQLA.

Informe a su proveedor de atención médica acerca de todos los medicamentos que toma, incluidos los medicamentos de venta con receta y los de venta libre, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas. FRUZAQLA podría afectar la forma en que actúan otros medicamentos y otros medicamentos pueden afectar la forma en que actúa FRUZAQLA.

En especial, informe a su proveedor de atención médica si toma diluyentes de la sangre (anticoagulantes).

Conozca los medicamentos que usa. Conserve una lista de sus medicamentos para mostrársela a su proveedor de atención médica y farmacéutico cuando reciba un nuevo medicamento.

Consulte la Información importante de seguridad adicional en todo el documento y la Información para el paciente en la Información [de prescripción completa](#) de FRUZAQLA que se acompaña.

 **Fruzaqla**®
(fruquintinib) capsules
5 mg • 1 mg



Estamos aquí para ayudarlo a comprender las opciones de cobertura, la asistencia financiera disponible y los recursos educativos.

Para hablar con un administrador de casos, llame al **1-844-817-6468**, opción 2. **Hablemos. Estamos disponibles de lunes a viernes, de 8 A.M. a 8 P.M., hora del este.**

Para obtener más información sobre Takeda Oncology Here2Assist, visite www.Here2Assist.com/patient/home

Visite FRUZAQLA.com para obtener más información

¿Qué es FRUZAQLA® (fruquintinib)?

FRUZAQLA es un medicamento recetado utilizado para tratar a adultos con cáncer de colon o recto que se ha extendido a otras partes del cuerpo (cáncer colorrectal metastásico [CCRM]) y que han recibido tratamiento previo con ciertos medicamentos contra el cáncer.

No se sabe si FRUZAQLA es seguro y eficaz en niños.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

Informe a su proveedor de atención médica acerca de todos los medicamentos que toma, incluidos los medicamentos de venta con receta y los de venta libre, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas. FRUZAQLA podría afectar la forma en que actúan otros medicamentos y otros medicamentos pueden afectar la forma en que actúa FRUZAQLA.

Consulte la Información importante de seguridad adicional en todo el documento, la Información importante de seguridad completa en las páginas 6-9 y la Información para el paciente en la Información [de prescripción completa](#) de FRUZAQLA que se acompaña.



ONCOLOGY

TAKEDA y  son marcas comerciales registradas de Takeda Pharmaceutical Company Limited. FRUZAQLA y  son marcas comerciales de HUTCHMED Group Enterprises Limited, utilizadas con licencia. HERE2ASSIST y  son marcas comerciales registradas de Millennium Pharmaceuticals, Inc. ©2025 Takeda Pharmaceuticals U.S.A., Inc. Todos los derechos reservados. US-FRZ-0413 04/25